

Vacuna	4-6 años de edad Escuela primaria (al nivel de kínder de transición/ kínder o más arriba)	7-17 años de edad Escuela primaria o secundaria	7° grado*
Polio (OPV or IPV)	4 dosis (3 dosis cumplen con el requisito si una se aplico al cumplir los 4 años de edad o despues).	4 dosis (3 dosis cumplen con el requisito si una se aplico al cumplir los 2 años de edad o despues).	
Difteria, Tétanos y Pertussis (Tos Ferina)	5 dosis de DTaP, DTP o DT (4 dosis cumplen con el requisito si una se aplico al cumplir los 4 años de edad o despues).	4 dosis de DTaP, DTP, DT, Tdap o Td (3 dosis cumplen con el requisito si la ultima se aplico al cumplir los 2 años de edad o despues. Para los alumnos de 7 ^o a 12 ^o grado, se requiere que una de esas dosis sea Tdap o DTaP/ DTP que se la hayan puesto al cumplir los 7 años de edad o despues).	1 dosis de Tdap o DTP/DTaP al cumplir los 7 años de edad o despues
Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR o MMR-V)	2 dosis (Ambas dosis deben haberse puesto al cumplir el 1er año o despues. Solo se requiere una dosis de las vacunas contra las paperas y la rubeola si es que recibio vacunas separadas).	1 dosis en o despues del primer cumpleaños. (La vacuna contra las paperas no es necesaria si es que recibio vacunas separadas).	2 dosis de MMR o cualquier vacuna contra el sarampion. (Ambas dosis deben haberse puesto al cumplir el 1er año o despues)
Hepatitis B (Hep B o HBV)	3 dosis		
Varicela (VAR, MMR-V o VZV)	1 dosis	1 dosis para alumnos de 7-12 años de edad 2 dosis para alumnos de 13-17 años de edad	